

Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce produit.

Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.

Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien.

Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

1. QU'EST-CE QUE CATIONORM ET DANS QUEL(S) CAS L'UTILISER

Cationorm est une émulsion ophtalmique hypotonique sans conservateur qui se présente sous la forme d'un liquide d'aspect laiteux.

Cationorm est composé de : huiles minérales, glycérol, tyloxapol, poloxamère 188, tris-hydrochlorure, trométhamine, chlorure de cétalkonium et eau pour préparations injectables.

Une unidose de **Cationorm** contient 0,4 ml d'émulsion stérile.

De part ses propriétés, **Cationorm** contribue à l'hydratation, à la lubrification et à la protection de la surface oculaire. Son utilisation est recommandée dans le traitement des symptômes de la sécheresse oculaire qui peuvent être caractérisés soit par des yeux qui piquent, démangent ou brûlent soit par une sensation de corps étranger dans l'œil (grain de sable, poussière...). Ces symptômes peuvent être liés à des facteurs extérieurs tels que la climatisation ou à une fatigue oculaire en relation, par exemple, avec un travail prolongé sur écran d'ordinateur.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER CATIONORM

Ne pas utiliser **Cationorm** si vous êtes ou avez été allergique à l'un des composants.

Ce produit n'est pas destiné au traitement d'autres affections oculaires.

Demander conseil à votre médecin ou votre pharmacien.

En cas d'instillation de plusieurs collyres, il est conseillé d'attendre au moins 5 minutes entre chaque collyre et d'utiliser **Cationorm** en dernier.

Cationorm n'altère pas la qualité des lentilles de contact.

3. COMMENT UTILISER CATIONORM

VOIE OCULAIRE.

La posologie recommandée est de 1 à 4 gouttes par jour.

Comment procéder à l'instillation ?

- Se laver les mains et détacher une unidose.
- Ouvrir l'unidose en tournant son embout.
- Incliner la tête en arrière et regarder vers le haut.
- Tirer doucement la paupière inférieure.
- Appuyer légèrement sur l'unidose afin d'instiller 1 goutte dans l'œil et cligner des paupières.
- Ne pas laisser la pointe de l'unidose toucher l'œil.

Usage unique. L'unidose est à utiliser immédiatement après ouverture et à jeter après utilisation.

Ne pas avaler.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme pour tout collyre, une gêne légère et transitoire liée à l'instillation du produit, est possible.

SI VOUS REMARQUEZ DES EFFETS INDESIRABLES NON MENTIONNES DANS CETTE NOTICE, VEUILLEZ EN INFORMER VOTRE MEDECIN OU VOTRE PHARMACIEN.

5. COMMENT CONSERVER CATIONORM

Conserver dans son emballage d'origine.

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser une unidose qui aurait été endommagée.

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'emballage.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est Mars 2009.

Fabricant :

NOVAGALI Pharma S.A. – Bâtiment Genavenir IV – 1, rue Pierre Fontaine - F-91058 EVRY Cedex



NOVAGALI
P H A R M A